닥터조물주 비뇨의학과

남성수술 후 안내서

수술 후 주의사항

귀두확대술 / 음경확대수술 / 길이연장

01 수술 후 소변 볼 때 묻지 않도록 조심하시고, 되도록 앉아서 소변을 보는 것이 편합니다.

02 샤워는 부분적으로 진행하시고, 실밥을 뽑고 나서 다음날부터 정상적인 샤워가 가능합니다.

03 성기를 고정시켜줄 수 있는 삼각팬티나 타이트한 속옷을 착용하시는 것이 좋습니다. 또한 음경을 아래쪽으로 내려서 일자를 유지시켜 주어야 합니다.
(트렁크를 입으면 공간이 생기므로, 성기가 움직이면서 마찰이 생겨 상처나 딱지가 생깁니다.)

04 소독하는 방법을 알고 계시면 이틀에 한 번씩 소독진행을 해주시고(소변이 묻으면 최대한 빨리 교체) 병원에 내원 가능하시면 건들지 마시고 내원날짜에 내원해주시면 됩니다.

05 수술 후 궁금하신 부분이나 문제가 있으면 반드시 병원과 상의 후 치료를 진행하셔야 합니다.

06 1달 동안 성관계/사우나/운동을 할 수 없습니다. 흡연은 최대한 자제해주세요.
(음주는 2주 뒤에 가능합니다.)

07 1달 동안 붕대로 성기를 감아 주셔야 합니다.
(붓기/음경모양을 잡아주는 역할)

08 수술 후 3~4일 정도는 봉합부위에서 미세 출혈이나 약물이 나올 수 있습니다.

09 수술 부위 주변으로 멍이 생기고 붓기가 생길 수 있습니다.

10 수술 후 회복을 위해 충분한 수면과 컨디션 조절이 필요합니다.

11 발기가 되면 일시적으로 길이가 짧아 보이고 완전 발기가 되지 않습니다.
(진피가 생착되는 과정 중 딱딱하기 때문에 해당 증상이 나타납니다. 생착이 되면 다시 돌아옵니다.)

12 수술 후 실밥은 7일(치골-가로봉합) ~ 14일(치골-세로봉합)뒤에 제거합니다. 2주가 제일 안전한 시기입니다.

13 흡연은 되도록 하루 5개비 미만으로 하시는 것이 좋습니다.
(흡연을 많이 하면 혈관이 수축되어 진피가 생착되는 속도가 더딜 수 있습니다.)

14 지방 주입기간은 6개월까지이며, 6개월이 지나면 폐기합니다.

Dr.JMJ UROLOGY

수술 후 생길 수 있는 증상

01 소변이 산발적으로 퍼져 나오고 시원하게 나오지 않을 수 있으며 잔뇨감이 남는 경우가 있습니다. 수술 후 음경에 전체적으로 압박붕대를 사용하기에 요도 쪽까지 압박이 되면서 생길 수 있는 증상입니다.

02 새벽에 발기 시나 아침발기 시, 진피조직과 음경 안쪽의 녹는 실로 인해 통증이 올 수 있습니다.

03 수술 후 초기에는 붓고 까맣게 멍이 들고 치료기간 중에 딱지가 생길 수 있습니다.

04 수술 후 초기에 짧아지는 느낌은 진피조직이 생착되기 전에 딱딱함이 유지되어 정상발기를 할 수 없기 때문입니다. 생착 과정에 따라 수술 전처럼 돌아오게 됩니다.

05 진피조직이 완전히 생착되고 혈관이 형성되는 시기는 3~6개월 정도입니다. 개인마다 차이가 있기 때문에 길게는 1년 정도 걸릴 수 있습니다.

06 귀두 확대 시 지방조직으로 인해 확대부위가 탄탄하게 유지되며 딱딱함이 느껴질 수도 있습니다.

07 지방을 뽑은 부위에서 피/약물이 섞여서 나올 수 있습니다.
(크게 문제가 되는 점은 아니며, 많이 나오면 해당 부위가 젖을 수도 있습니다. 2~3일 지나면 괜찮아집니다.)

» 대체진피, 자가진피, 미세지방, 발기부전 보형물 등의 시술을 시행 받음에 있어, 수술 중 혹은 수술 후 출혈, 염증 등의 합병증이 일어날 수 있고 불충분한 소독이나 음주, 흡연, 목욕, 이른 성관계 등으로 인해 상처에 염증이 왔을 경우, 음경 확대물을 제거하고 창상감염을 치료한 후 재봉합을 시행 할 수 있습니다. 또한 원인불상의 피부괴사로 인한 피부 결손 시 1~2개월 이상의 치료시간이 필요합니다.

» 제거 시 제거비용 및 치료비용은 무료로 가능하지만 환불 및 재수술은 해드리지 않습니다.

» 귀두 및 음경확대 수술 시 확대되는 모양과 크기를 충분히 이해하고 수술을 진행합니다.

» 길이연장 수술 시 고환피부 및 음경 피부에 따라서 늘어나는 범위에 차이가 있을 수 있습니다.

» 수술 후 6개월 시점이 수술 결과를 최종적으로 평가하는 시기입니다.

» 본인은 빠른 치료를 위해 의료진과 최대한 협조를 할 것을 약속해 주시기 바랍니다.